

داروها و غذاهای ممنوعه در بیماری فاویسم

آنتی بیوتیک ها: به خصوص داروهای سولفا(مانند سولفاستامید، سولفامتوکسازول، سولفاپیریدین و کوتریموکسازول)، کینولون‌ها(مثل سیپروفلوکساسین و لووفلوکساسین)، نیتروفورانتوئین، داپسون، نالیدیکسیک اسید، کلرامفنیکل، فورازولیدون، ایزونیاژید، نیتروفوازون، استرپتومايسين

داروهای ضد مالاریا: مانند پریماکین، کلروکین

داروهای ضد سرطان

آسپرین با دوز بالا

سایر داروها مانند: آمی‌تریپتیلین، متیلن بلو، دیمرکاپرول، منتول، پنی سیلامین، پروبنسید، فنیل هیدرازین، فناستین، مپاکرین، مزالازین، کلشی‌سین، دیازپام، آنالوگ‌های ویتامین K فوروسماید، گلیبورید، ایبوپروفن، فنیل بوتازون، پروکائین آمید، پیری‌متامین، سولفادیازین، سولفونیل اوره، تری هگزی فینیدیل، دوپامین، کینیدین، پارا آمینو بنزوئیک اسید، دیکلوفناک سدیم، تولوئیدین بلو، هیدرالازین

نفتالین

حنا

باقلا: اما مشخص نیست که سایر حبوبات مانند لوبیا، نخود، عدس یا بادام زمینی، باعث همولیز می‌شوند یا خیر؟

سایر غذاها: مانند بلوبری(گاهی)، شراب قرمز، سویا و سس سویا، آب نیروزا(Tonic Water)

خربزه تلخ(هندوانه ابوجهل)، رنگ‌های مصنوعی غذایی(به‌ویژه رنگ آبی)، نگهدارنده‌های مصنوعی غذایی، خمیر دندان و دهان‌شویه‌ها و آب‌نبات‌های حاوی منتول، کافور

غذاهای سولفیت‌دار: مانند انواع کیک‌ها و کوکی‌ها، آب‌لیموهای صنعتی، میوه‌های یخ‌زده و کنسرو شده، نشاسته ذرت، کراکرها، سس‌هایی مانند کچاپ و خردل، گوشت‌های پروسس شده مانند هات داگ و سوسیس، میوه‌ها و سبزیجات خشک شده مانند کشمش، صدف، مرباهایی که مواد نگهدارنده دارند، چیپس، گوجه‌فرنگی پروسس شده مانند پوره یا خمیر گوجه، سرکه

مصرف مکمل‌های ویتامین C: مصرف این ویتامین با دوز بالا و به صورت مکمل ویتامینی می‌تواند سبب همولیز شود. اما مصرف این ویتامین در غذا و میوه‌ها، باعث همولیز نمی‌شود و مصرف آن، بلا مانع است.

عفونت‌ها: چه ویروسی و چه میکروبی، می‌توانند پروسه‌ی همولیز را شروع کنند.